

# Canigen® R

## VACINA INATIVADA CONTRA RAIVA DOS CÃES E GATOS

### USO VETERINÁRIO

#### ■ FÓRMULA

##### Fração líquida

Vírus da raiva (cepa VP12) inativado ..... mínimo de 1 UI  
Veículo q.s.p. .... 1,0 mL

#### ■ PROPRIEDADES

Canigen® R é uma vacina preparada com uma cepa (amostra fixa VP12) do vírus rábico originalmente isolado por Louis Pasteur. Seu cultivo é feito sobre linhagens celulares de hamster e, após inativação química, a vacina é formulada com hidróxido de alumínio.

#### ■ INDICAÇÕES

Canigen® R é indicada para imunização de cães e gatos contra a raiva.

#### ■ POSOLOGIA E MODO DE USAR

Aplicar por via subcutânea respeitando-se as condições habituais de assepsia, 1 dose de 1,0 mL independentemente do peso do animal.

Não fracionar a dosagem indicada. Uma vez aberto o frasco, utilizar todo o conteúdo.

A vacinação pode ser feita a partir da 12ª semana de vida do animal.

Um reforço anual é recomendado.

Os programas de vacinação devem ficar a critério do Médico Veterinário.

#### ■ PRECAUÇÕES

Canigen® R mostrou-se eficaz na vacinação de animais saudáveis. Uma boa resposta imunológica pode ser comprometida quando animais parasitados, mal nutridos, em período de incubação de doença infecciosa ou estressados são vacinados.

Embora raramente, como para todo produto biológico, reações de hipersensibilidade podem acontecer. Nestes casos, usar adrenalina ou corticoides e instituir a terapia de suporte adequada.

Estudos de segurança em gatas prenhes não foram realizados, por isso, não recomendamos a administração da vacina em animais nessas condições. Nos dias que antecederem ou sucederem a vacinação, o uso concomitante de substâncias antimicrobianas ou antiinflamatórias pode interferir no desenvolvimento e manutenção de uma resposta imune adequada. Descartar frascos, seringas e produto não utilizado adequadamente. Como a resposta imune é influenciada por um grande número de fatores genéticos e ambientais, não é possível garantir a proteção de 100% dos animais de uma população aleatória através da vacinação.

#### ■ REAÇÕES ADVERSAS

Hipertermia transitória e apatia podem ser observadas nos animais em até 24 horas após a aplicação do produto. Ocasionalmente, pode ser observado edema no ponto de injeção, que desaparece espontaneamente dentro de 4 semanas.

**Conservar em temperatura entre 2°C e 8°C, ao abrigo da luz e não deve ser congelado.**

**Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO PELO MÉDICO VETERINÁRIO.**

#### ■ PRAZO DE VALIDADE

24 (vinte e quatro) meses após a data de fabricação.

#### ■ APRESENTAÇÃO

Caixas com 10, 20 ou 50 frascos-ampola com 1 dose de 1,0 mL cada, acompanhada por 1 bula.

Ligue C.A.S.A.: 0800 13 65 33

**Marca Registrada® de VIRBAC, França - PRODUTO IMPORTADO**